

Десять захворювань, від яких ви можете надійно захистити дитину

Захворювання	Прояви та ускладнення
Дифтерія	5-10% всіх людей, які захворіли на дифтерію, помирають. Ускладненнями дифтерії являються: запалення серцевого м'яза (міокардит), аритмії, запалення нервів, що призводять до паралічів (наприклад – діафрагми, очей, м'язів піднебіння, дихальних м'язів, м'язів рук та ніг), пневмонія, запалення нирок (нефроз), дифтерійний круп. Всі ці ускладнення можуть бути причиною смерті.
Правець	Смертність досягає 40% . Ускладнення правця: переломи кісток, відриви м'язів від місць їх кріплення, судомні скорочення дихальних м'язів, діафрагми та м'язів гортані, що може призвести до смерті від удушся.
Кашлюк	Характеризується нападopodobним спазматичним кашлем. Ускладнення кашлюка: пневмонія, порушення мозкового кровообігу, крововиливи, грижі, розриви барабанної перетинки вуха (як наслідок – глухота) і діафрагми.
Гепатит В	В світі щорічно від 0,5 до 1,2 мли. людей помирають від захворювань (рак і цироз печінки), причина яких є вірус гепатиту В.

	До 90% новонароджених, інфікованих вірусом гепатиту В, стають хронічними носіями цієї інфекції.
Поліомієліт	Вірус вражає клітини спинного мозку та рухових черепних нервів призводячи до розвитку паралічів і атрофії м'язів. Смертність від паралітичної форми поліомієліту складає 2-5% у дітей та 15-30% у дорослих.
Гемofilьна інфекція	Розповсюджена інфекція, з якою пов'язані майже всі ускладнення після перенесеного грипу, і яка характеризується гнійними процесами в різних органах. Ускладнення гемofilьної інфекції: менінгіти (запалення оболонки головного мозку), пневмонія, гнійний плеврит, абсцеси різної локалізації, запалення суглобів, підшкірної клітковини (флегмони), гнійні отити, синусити.
Туберкульоз	Від туберкульозу на земній кулі кожні 25 хвилин помирає 1 людина. В Україні близько 700 000 хворих на туберкульоз. Ускладнення: туберкульозний менінгіт, легенева кровотеча, хронічна серцево-легенева недостатність.

Кір	У світі близько 10% смертей дітей віком до 5 років припадає на кір . Ускладнення: пневмонія з ураженням плеври та абсцедуванням у легенях, енцефаліти, виразково-некротичні ураження слизових оболонок ротової порожнини та кишечника, гнійні отити, тромбоз судин головного мозку та очей.
Краснуха	В світі щороку реєструється близько 100тис випадків вродженої краснухи. Прояви вродженої краснухи: мікроцефалія, гідроцефалія, глухота, катаракта, сліпота, вроджені вади серця та кардіопатії. Ускладнення краснухи: арторопатії, отити, пневмонії, нефрити, поліневрити, краснушні енцефаліти та енцефаломієліти, які в 15-20% випадків закінчуються летально.
Паротит	Ускладнення: орхіт (запалення яєчок) з послідуочим безпліддям, панкреатит, енцефаліт та менінгоенцефаліт, ураження внутрішнього вуха зі швидким розвитком стійкої глухоти, атрофія зорового нерву.

Спитайте педіатра, як захистити вашу дитину від цих захворювань

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

у перші 18 місяців життя* від 2 до 18 років*

	1 доба	3-5 доб	1 місяць	2 місяці	4 місяці	6 місяців	12 місяців	18 місяців	6 років	7 років	14 років	16 років	Дорослі
Гепатит В	1		2			3							
Туберкульоз		1											
Кір Епідемічний паротит Краснуха							1		2				
Дифтерія Правець			1	2	3		1	2			3		
Кашлюк			1	2	3		1						
Поліомієліт			1	2	3		1	2			3		
ХіВ-інфекція			1	2			1						

Додаток: Вакцини на складі
випитими батьки про вакцинацію

Автор-укладач:
Головний дитячий інфекціолог
Києва, доцент кафедри
дитячих інфекційних хвороб та
дитячої нефрології Національного
медичного університету
імені Д. Шевченка академік НАН України
П. Шулєпа, кандидат медичних
наук - Федір Іванович Ляшко

Замовляйте!
Для лікарів та фахівців - надсилайте запит на
info@stoprobo.in.ua або info@stoprobo.org.ua
Для батьків - запитуйте у лікарів та на зустрічах із
фахівцями.
Замовляйте у форматі PDF та отримуйте книгу корисну
інформацію:
stoprobo.in.ua, stoprobo.org.ua, zdravie.com.ua





* чинний, затверджений Міністерством охорони здоров'я України, www.moz.gov.ua

ЩЕПЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ КАЛЕНДАРЯ

Для дітей віком від 2 місяців до 6 років 11 місяців 29 днів

Вакцини, анатоксини	Мінімальний інтервал між дозами		
	1-2-а дози	2-3-я дози	3-4-а дози
АКДП, АакДП1	1 місяць	1 місяць	6 місяців
АДП	1 місяць	9 місяців	
Проти поліомієліту	1 місяць	1 місяць	6 місяців
Проти гепатиту В	1 місяць	1 місяць	
Проти кору, паротиту, краснухи	1 місяць	1 місяць	
НіВ-вакцина	1 місяць, 2-а доза не вводиться, якщо 1-у дозу введено у віці від 12 місяців до 4 років 11 місяців 29 днів	6 місяців, 3-я доза не вводиться, якщо 2-у дозу введено у віці від 12 місяців до 4 років 11 місяців 29 днів	

Для дітей віком від 7 до 17 років 11 місяців 29 днів

Вакцини, анатоксини	Мінімальний інтервал між дозами		
	1-а доза	2-а доза	3-а доза
АДП-М	1 місяць	6 місяців	
Проти гепатиту В	1 місяць		
Проти кору, паротиту, краснухи	1 місяць	1 місяць	
Проти поліомієліту	1 місяць	1 місяць	6 місяців

ДОДАТКОВІ ЩЕПЛЕННЯ

В Національному календарі описаний перелік захворювань, проти яких існують зареєстровані в Україні вакцини. У разі, якщо батьки хочуть захистити свого малюка додатково, або для власного захисту вони можуть це зробити, придбавши вакцину в аптеці за власні кошти за направленням лікаря.

Щеплення для профілактики:

- Вітряної віспи
- Гепатиту А
- Гепатиту В
- Грипу
- Кашлюку (з метою ревакцинації)

- Краснухи
- Епідемічного паротиту
- Кору
- Пневмококової інфекції
- Менінгококової інфекції

- Папіломавірусної інфекції
- Ротавірусної інфекції
- Захворювання, для імунопрофілактики яких існує вакцина, зареєстрована в Україні

Вакцинацію проводять зареєстрованими в Україні вакцинами/анатоксиними відповідно до інструкції із застосування.
Наказ МОЗ

ЩЕПЛЕННЯ — ЄДИНИЙ ОБЕРЕГ!



менше
50%
дітей в Україні повністю вакциновані



95%
дітей повинні мати щеплення для попередження спалаху поліо

Ліків від поліомієліту не існує.
Єдиний захист — вакцинація.




ТРИНА



ЩЕПЛЕННЯ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ

ІНТЕРВ'Ю

ВІД ДИФТЕРІЇ, КАШКОКА, ПРАЩА ПОЛОМІЄЛИТУ, КОРИ, КРАСЛУХИ НАРОТНУ, ВІТЯНОЇ, ВІСНИ ГЕПАТИТУ В ТА ЛЕМОФІЛНОЇ ІНФЕКЦІЇ

ЗІГНО
КАЛЕНДАР
ЩЕПЛЕНЬ



НАЙКРАЩІ СВІТОВІ ВАКЦИНИ РЕКОМЕНДУЄМІ МОЮ УВАГОЮ

ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ



Міфи про вакцинацію: замініть страх фактами

МІФ «Не треба робити щеплення від захворювань, яких в Україні вже давно немає»


ПРАВДА
Деякі захворювання, яким можна запобігти шляхом вакцинації, і справді стали дуже рідкісними саме завдяки вакцинам. Проте, на жаль, усе ще трапляються давно забуті інфекції. З минулого року в Україні триває спалах кору, з 2015 року — спалах кашлюку, 2015 року також був спалах поліомієліту. Якщо ваша дитина не пропустила жодного планового щеплення, це дасть їй найкращий захист від захворювань.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЦЕНТР ГОМАЛОГО ЗДОРОВ'Я

unicef

Смертність від віспи в Бостоні (США) в 1700-1920 рр.



ВАКЦИНАЦІЯ КПК В УКРАЇНІ


Діти 1–9 років

МІНІСТЕРСТВО
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ



1 рік і старші

- входить відповідно до календаря щеплень



6 років

- входить відповідно до календаря щеплень, але не раніше за 1 місяць від попередньої дози КПК.

Старше 6 років

- входить до відповідної нормативної документації на 1 місяць від першої дози КПК.



Дитина має імунітет проти кору, паротиту та краснухи!

Кір убиває. Вакцинація захищає

Спалахи кіру мають щорічний характер і відбуваються кожні 5–6 років. Головна причина спалахів — низьке охоплення щепленнями. Специфічний захист від кіру немає. Проте вакцинацією можна запобігти. Єдиний надійний метод профілактики — вакцинація.

Кір має серйозні ускладнення

Захворювання може призвести до пневмонії, вузловидної енцефаліти, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.

2 дози вакцини захищають від кору



Згідно з календарем, у 12 місяців проводиться перше щеплення від кору, а в 6 років — планова ревакцинація. Ці дві дози вакцини захищають дитину від кору.

Коліктивний імунітет потрібен усім

Всіх нас звичайно виховували. Один місяць від початку в середньому, до повної спеціальної вакцинації не менше за 92%, хвороба не буде поширюватися. Спеціальна вакцинація формує колективний імунітет.



Усе менше батьків вважають себе протівниками щеплень



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ



ЦЕНТР
СПІЛЬНОГО
ЗДОРОВ'Я





ПІДГОТОВКА ДО ЩЕПЛЕННЯ І НАГЛЯД ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ

5 протипоказань до вакцинації?

1

Гостре захворювання, що супроводжується температурою вище 38,5°C.



2

Серйозна алергічна реакція на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини.



3

Захворювання і стани організму, при яких імунітет після введення вакцини може не сформуватися (наприклад, при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).



4

При вагітності не рекомендоване введення „живих” вакцин (вагітні жінки в багатьох країнах вакцинуються від грипу щорічно інактивованими вакцинами).



5

Дітям з неконтрольованою епілепсією не рекомендовано вводити цільноклітинні вакцини проти кашлюка.







Міфи про вакцинацію: замініть страх фактами

МІФ

«Дитина, що перебуває на грудному вигодовуванні, захищена, тож і вакцинацію проводити не потрібно»

ПРАВДА

Грудне вигодовування дуже важливе для здоров'я дитини. Однак воно не здатне захистити її від інфекцій, проти яких проводиться вакцинація. Наприклад, дитина, яка перебуває на грудному вигодовуванні, при інфікуванні кашлюком може тяжко захворіти і навіть померти.




Міфи про вакцинацію: замініть страх фактами

МІФ

«Вакцина може ослабити або перевантажити імунну систему»

ПРАВДА

Природне інфікування певними вірусами може ослабити опірність організму. Проте вакцини діють інакше. Вакцинальні віруси настільки ослаблені, що не можуть вплинути на імунітет. Перевантажити імунну систему вакцинація також не здатна. При інфекційному захворюванні навантаження на імунітет у кількох разів вище, ніж при вакцинації. Навіть якщо одночасно ввести вакцини проти 10 інфекційних захворювань, задіється лише 0,1% імунної системи.





ПІДГОТОВКА ДО ЩЕПЛЕННЯ І НАГЛЯД ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ

6 речей, на які слід звернути увагу після вакцинації

1 У разі підвищення температури дайте дитині жарознижувальне без вмісту аспірину

2 Не одягайте на дитину забагато одягу і не загортайте у кілька ковдр

3 Температура у кімнаті, де перебуває дитина, повинна становити близько 22°C

4 Дитина має пити багато рідини

5 Повідомте лікарю про підвищення температури чи інше погіршення стану дитини

6 Спитати лікаря, коли необхідно зробити наступне щеплення





ЩЕПЛЕННЯ. ЗА І ПРОТИ?



Вакцинація – єдиний спосіб уберегти дитину від смертельно небезпечних або дуже серйозних захворювань, що погано піддаються лікуванню...

Перші два роки життя вважаються ідеальним періодом для щеплень: імунна система в стані правильно відреагувати на всі призначені ін'єкції виробленням необхідних захисних антитіл.

Аргументи за ...

Кожне щеплення має свої терми, схему і шляхи введення. Вакцина створює імунітет, необхідний для захисту організму від конкретного збудника хвороби. Застосовуються вони більше 50 років. За цей період їх безпека і ефективність була неодноразово доведена у всіх країнах. Усі вакцини, які використовуються у нас в країні, зареєстровані та пройшли жорсткий контроль якості.

Аргументи проти...

Нвіть у разі проведення щеплень за всіма правилами не має 100%-ї гарантії вироблення імунітету. Кожен організм є індивідуальним і сприймає вакцину по-своєму. Навіть дозволені до застосування і безпечні вакцини можуть дати деякі ускладнення, алергічні реакції.

Так, щеплення АКДС (а точніше, компонент кашляку, що входить до її складу) нерідко викликає негативні наслідки для дитячого організму. Особливо важко переживають її діти з неврологічною патологією. Тому перед першою АКДС-вакцинацією потрібно проконсультуватися з неврологом.

Введення будь-якої вакцини викликає відповідну реакцію організму, яка може виявитися у вигляді почервоніння місця, алергії, нудоти, болю в місці уколів. Нормальним вважається підвищення температури тіла, короткочасне нездужання (головний біль, порушення сну, апетиту).

Щоб уникнути ускладнень, потрібно дотримуватися індивідуального плану щеплень малюка. Є абсолютні протипоказання до вакцинації: розвиток алергічних реакцій на попередню вакцинацію, ураження мозку протягом семи днів від попереднього щеплення.

ЯК МАЮТЬ РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИМ ДІТЯМ												
Гепатит В	Туберкульоз	Гепатит В	Дифтерія, коклюш, черевний тиф	Дифтерія, коклюш, правля	Дифтерія, коклюш, правля	Корь, паротиту, свинячий грип	Дифтерія, коклюш, правля	Корь, свинячий грип, дифтерія, коклюш, правля, Поліомієліту	Туберкульоз	Поліомієліту	Дифтерія, правля	Дифтерія, правля (повторно 10 років)
1 рік	1 рік	1 рік	1 рік	1 рік	1 рік	1 рік	1 рік	1 рік	1 рік	1 рік	1 рік	10 років

Вакцинація батькам
Щеплення – справа дуже відповідальна. Пам'ятайте, що робити щеплення можна лише цілком здоровим дітям!
Вимагайте сертифікату на вакцину, якщо він є обов'язковим, та Міністерство охорони здоров'я гарантує відшкодування можливого збитку здоров'ю, якщо ні, то всі претензії лише до фірми – виробника вакцини. Переконайтеся, що написи на ампулі й коробці з вакциною співпадають.
Після щеплення, спостерігайте за дитиною: якщо буде двадцять, зверніться до того ж лікаря, який робив щеплення. Слідкуйте, щоб усі ускладнення були зафіксовані в медичній карті. Напишіть запис про те, щоб без вашої згоди й присутності дитини щеплень не робили. Простягте, щоб заява була включена в медичну карту і ваше шевлення фіксувалося.